

OVER UW BEHANDELING

Men heeft u Lixiana voorgeschreven, een antistollingsmiddel dat uw bloed verdunt en helpt voorkomen dat u bloedstolsels krijgt. Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel precies volgens de instructies van uw arts inneemt.

- Als u een dosis bent vergeten, neem hem dan onmiddellijk in en ga dan de volgende dag normaal door – neem niet het dubbele van de voorgeschreven dosis op een enkele dag in.

- Start niet met andere geneesmiddelen (inclusief verkrijgbare) zonder uw arts te raadplegen.
- Stop niet met het innemen van Lixiana zonder uw arts te raadplegen daar dit uw risico op het ontwikkelen van een bloedstolsel kan verhogen.
- Lees de Patiëntenbijsluiter die u in elke verpakking van Lixiana vindt.

WANNEER MOET U MEDISCH ADVIES VRAGEN?

RISICO OP BLOEDING

De inname van een antistollingsmiddel zoals Lixiana kan uw risico op bloedingen verhogen. Het is daarom belangrijk zich bewust te zijn van de mogelijke verschijnselen en symptomen van bloedingen en **onmiddellijk** met uw arts te praten als u een van de volgende zaken ondervindt:

- Bloeduitstorting of bloeding onder de huid
- Bloed in de urine
- Ophoesten van bloed
- Braken van bloed of substantie die lijkt op gemalen koffie

- Neusbloedingen of snijwonden die lang blijven bloeden
 - Teerleurige ontlasting
 - Duizeligheid of plotselinge hoofdpijn
 - Onverklaarde vermoeidheid
 - Abnormale vaginale bloeding, waaronder zwaardere of langdurige menstruatie
- Praat met uw arts als u ongewone symptomen ondervindt.



NL 113054

PATIËNTEN- WAARSCHUWINGSKAART

Lixiana®
filmomhulde tabletten
edoxaban

Zorg dat u deze kaart altijd bij u hebt.

Toon deze kaart vóór elke medische behandeling of ingreep aan uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, apotheker, chirurg of tandarts.

49 mm

50 mm

51 mm

53 mm

52 mm

 **Daiichi-Sankyo**
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Text & Design Management
Luitpoldstraße 1
D-85276 Pfaffenhofen

Format [mm]:	255 x 76 (Endformat 53 x 76)	Außen
Produkt:	PAC LIXIANA 15+30+60 FT	
Material:	NL 113054	
Laetus Code:	286	
Druckfarben:	Schwarz, PANTONE 233 C	
Datum:	10.07.2015 - 09:22	

**Korrekturabzug
PROOF**

PATIËNTENINFORMATIE	BEHANDELINGSINFORMATIE (in te vullen door de arts)	INFORMATIE OVER DE VOORSCHRIJVER	INFORMATIE VOOR BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG		
Naam van de patiënt:	Lixiana is voorgeschreven op een eenmaal daagse dosis van: mg	Voor meer informatie of in geval van nood kunt u contact opnemen met:	- Lixiana is een orale antistollingsfactor Xa-remmer. - Wanneer een invasieve ingreep nodig is, dient ten minste 24 uur van tevoren te worden gestopt met Lixiana en dient men zeer voorzichtig te zijn. - Lixiana kan het risico op bloedingen verhogen. In geval van klinisch significante bloeding, stop onmiddellijk met de behandeling.	Coagulatietests zoals INR, protrombinetijd (PT) of geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) zijn geen nuttige meting van het effect van Lixiana. Een gekalibreerde anti-factor-Xa- assay kan echter bijdragen tot meer geïnformeerde klinische beslissingen.	
Geboortedatum:	Gestart op: / (mm/jj)	Naam van de arts:			Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken (SPC) voor meer informatie.
In een noodgeval verzoeken wij u contact op te nemen met:	Bloedtype:	Telefoonnummer, praktijkstempel:			
Naam:	Andere geneesmiddelen/ aandoeningen:	Handtekening van de arts:			
Telefoonnr.:					
52 mm	53 mm	51 mm	50 mm	49 mm	

 Daiichi-Sankyo Daiichi Sankyo Europe GmbH Text & Design Management Luitpoldstraße 1 D-85276 Pfaffenhofen	Format [mm]:	255 x 76 (Endformat 53 x 76)	Innen
	Produkt:	PAC LIXIANA 15+30+60 FT	
	Material:	NL 113054	
	Druckfarben:	Schwarz, PANTONE 233 C	
	Datum:	10.07.2015 - 09:22	